Полиморфный вариант rs1739843 гена белка теплового шока 7 (*HSPB7*) и его связь с вариантами клинического течения и исходами у пациентов с гипертрофической кардиомиопатией (результаты 10-летнего наблюдения)

Стрельцова А.А.¹, Гудкова А.Я.^{1,2}, Полякова А.А.^{1,2}, Пыко С.А.³, Костарева А.А.^{1,2}

Цель. Изучить связь полиморфного варианта rs1739843 гена белка теплового шока 7 (*HSPB7*) с вариантами клинического течения и исходами заболевания при гипертрофической кардиомиопатии (ГКМП).

Материал и методы. В исследование включено 108 пациентов с ГКМП и хронической сердечной недостаточностью (ХСН) и сохраненной ФВ ЛЖ ($\geq 50\%$) в возрасте ≥ 45 лет. Группу контроля составили 192 практически здоровых человека. Дизайн исследования включал в себя оценку особенностей клинического течения, определения исходов ГКМП с применением нового методического подхода, предложенного Rowin EJ, et al. (2017). Полиморфный вариант rs1739843 гена *HSPB7* был идентифицирован методом полимеразной цепной реакции в режиме "реального времени".

Результаты. У больных ГКМП и ХСН с сохраненной ФВ ЛЖ ($\geq 50\%$) была выявлена значимо большая частота встречаемости генотипа ТТ и аллеля Т полиморфного варианта rs1739843 гена *HSPB7*, по сравнению с контрольной группой. Генотип СС и аллель С в большей степени характеризовал группу контроля. Распространенность генотипа ТТ в группе ГКМП составила 20,4% vs 4,2% в контрольной группе (ТТ: ТС+СС, отношение шансов (ОШ) = 5,88, 95% доверительный интервал (ДИ) = 2,52-13,75, $p < 0,001$). Генотип СС выявлен в 80,2% в контрольной группе vs 31,5% в группе ГКМП (СС: ТС+ТТ, ОШ = 0,11, 95% ДИ = 0,07-0,19, $p < 0,001$). Распределение аллелей С:Т полиморфного варианта rs1739843 гена *HSPB7* для группы ГКМП составило 55,6: 44,4% vs 88,02: 11,98% в группе контроля (ОШ = 5,88, 95% ДИ = 3,91-8,85, $p < 0,001$). При малосимптомном течении ГКМП, генотип ТТ и аллель Т полиморфного варианта rs1739843 гена *HSPB7* также встречаются значимо чаще, чем в контрольной группе (16,7% vs 4,2%, соответственно (ТТ: ТС+СС, ОШ = 4,60, 95% ДИ = 1,63-12,99, $p < 0,001$)). У пациентов с ГКМП в возрасте ≥ 45 лет, аллель Т встречался значимо чаще при появлении двух синдромов ГКМП: ХСН III-IV функционального класса (ФК) (NYHA)+ФП (18,8% vs 6,6%, соответственно), а также трёх синдромов: ХСН III-IV ФК (NYHA)+ФП+ВСС (4,2% vs 1,6%, соответственно), по сравнению с аллелем С.

Заключение. Симптомное течение ГКМП в возрастной группе ≥ 45 лет с наличием 2 и более синдромов характеризуется неблагоприятным прогнозом. У больных ГКМП и ХСН с сохраненной ФВ ЛЖ ($\geq 50\%$) в возрасте ≥ 45 лет была выявлена значимо большая частота встречаемости генотипа ТТ и аллеля Т полиморфного варианта rs1739843 гена *HSPB7*, по сравнению с контрольной группой. При малосимптомном течении ГКМП, генотип ТТ и аллель Т полиморфного варианта rs1739843 гена *HSPB7* также встречаются значимо чаще, чем в контрольной группе.

У пациентов с ГКМП аллель Т полиморфного варианта rs1739843 гена *HSPB7* ассоциирован с наличием 2 и более синдромов, в составе которых есть ХСН.

Ключевые слова: гипертрофическая кардиомиопатия, синдромы, хроническая сердечная недостаточность с сохраненной фракцией выброса левого желудочка, полиморфный вариант rs1739843 гена *HSPB7*.

Конфликт интересов: не заявлен.

Финансирование. Работа выполнена в рамках Государственного задания Министерства здравоохранения Российской Федерации по теме: "Молекулярно-генетические предикторы и морфо-функциональные фенотипы сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса левого желудочка при кардиомиопатиях различного генеза" № госрегистрации АААА-А18-118070690073-2.

¹ФГБОУВО Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова Минздрава России, Санкт-Петербург; ²ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова Минздрава России, Санкт-Петербург; ³СПбГЭТУ "ЛЭТИ", Санкт-Петербург, Россия.

Стрельцова А.А. — врач ультразвуковой диагностики, ORCID: 0000-0002-2766-8946, Гудкова А.Я. — д.м.н., зав. лабораторией кардиомиопатий Института сердечно-сосудистых заболеваний, профессор кафедры факультетской терапии; в.н.с. Института молекулярной биологии и генетики, ORCID: 0000-0003-0156-8821, Полякова А.А. — м.н.с. лаборатории кардиомиопатий Института сердечно-сосудистых заболеваний; с.н.с. НИО инфильтративных заболеваний сердца Института молекулярной биологии и генетики, ORCID: 0000-0002-6655-5274, Пыко С.А. — к.т.н., доцент кафедры радиотехнических систем, ORCID: 0000-0001-6625-3770, Костарева А.А. — к.м.н., доцент кафедры факультетской терапии; директор Института Молекулярной биологии и генетики, ORCID: 0000-0002-9349-6257.

*Автор, ответственный за переписку (Corresponding author):
anikas1985@gmail.com

АГ — артериальная гипертензия, ВСС — внезапная сердечная смерть, ГКМП — гипертрофическая кардиомиопатия, ФВ ЛЖ — фракция выброса левого желудочка, ФК — функциональный класс, ФП — фибрилляция предсердий, ХСН — хроническая сердечная недостаточность, *HSPB7* — белок теплового шока 7.

Рукопись получена 31.01.2019

Рецензия получена 13.03.2019

Принята к публикации 20.03.2019

Для цитирования: Стрельцова А.А., Гудкова А.Я., Полякова А.А., Пыко С.А., Костарева А.А. Полиморфный вариант rs1739843 гена белка теплового шока 7 (*HSPB7*) и его связь с вариантами клинического течения и исходами у пациентов с гипертрофической кардиомиопатией (результаты 10-летнего наблюдения). *Российский кардиологический журнал*. 2019;24(10):7-15
doi:10.15829/1560-4071-2019-10-7-15

Polymorphic variant rs1739843 of heat shock protein beta-7 (*HSPB7*) gene and its relationship with on clinical profile and outcomes in patients with hypertrophic cardiomyopathy (results of a 10-year follow-up)

Streltsova A. A.¹, Gudkova A. Ya.^{1,2}, Polyakova A. A.^{1,2}, Pyko S. A.³, Kostareva A. A.^{1,2}

Aim. To determine the impact of polymorphic variant rs1739843 of the *HSPB7* gene on clinical profile and outcomes in patients with hypertrophic cardiomyopathy (HCM).

Material and methods. The study population consisted of 108 patients with HCM ≥45 years old. The control group included 192 healthy donors. The design of the study included an assessment of the clinical course, determining the outcome of HCM using a new methodological approach proposed by Rowin EJ, et al. (2017). Polymorphic variant rs1739843 of the *HSPB7* gene was genotyped by allele-specific real-time polymerase chain reaction (PCR) assay.

Results. It was found a significant increase in frequency of TT genotype of rs1739843 of the *HSPB7* gene in patients with HCM — 20,4%, compared with control group — 4,2% (TT: TC+CC, odds ratio (OR) =5,88, 95% confidence interval (CI) =2,52-13,75, p<0,001). High prevalence of CC genotype of rs1739843 of the *HSPB7* gene was observed in control group — 80,2% vs 31,5% in HCM group (CC: TC+TT, OR=0,11, 95% CI=0,07-0,19, p<0,001). The allele frequency (C:T) also differs between HCM and control groups — 55,6:44,4% in HCM vs 88,02:11,98% in control group (OR=5,88, 95% CI=3,91-8,85, p<0,001). It was also found a significant increase in frequency of TT genotype and T allele of rs1739843 of the *HSPB7* gene in HCM patients with oligosymptomatic HCM course — 16,7%, compared with control group — 4,2% (TT: TC+CC, OR=4,60, 95% CI=1,63-12,99, p<0,001). HCM patients ≥45 years old showed a significant increase in T allele frequency in cases of presence of 2 (FC III-IV CHF (chronic heart failure)+AF (atrial fibrillation), 18,8% vs 6,6%) and 3 adverse pathways (FC III-IV CHF+AF+SCD (sudden cardiac death), 4,2% vs 1,6%).

Conclusion. HCM progression along 2 and more adverse pathways in patients ≥45 years old has been characterized with adverse outcome. The T allele and TT genotype of rs1739843 of the *HSPB7* gene were more frequent in patients with HCM ≥45 years old, compared with control group. It was also found a significant increase in frequency of TT genotype and T allele of rs1739843 of the *HSPB7* gene in HCM patients with oligosymptomatic HCM course, compared with control group.

Allele T of rs1739843 of the *HSPB7* gene is associated with 2 and more adverse pathways of HCM progression.

Key words: hypertrophic cardiomyopathy, syndrome, chronic heart failure with preserved ejection fraction, polymorphic variant rs1739843 of the *HSPB7* gene.

Conflicts of Interest: nothing to declare.

Funding. This study was carried out as part of the State assignment of the Ministry of Health of the Russian Federation on the topic: "Molecular genetic predictors and morphological and functional phenotypes of heart failure with a preserved ejection fraction of the left ventricle in cardiomyopathies of various genesis" State Authorization № AAAA-A18-118070690073-2.

¹Pavlov First Saint Petersburg State Medical University, St. Petersburg; ²Almazov National Medical Research Center, St. Petersburg; ³Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", St. Petersburg, Russia.

Streltsova A. A. ORCID: 0000-0002-2766-8946, Gudkova A. Ya. ORCID: 0000-0003-0156-8821, Polyakova A. A. ORCID: 0000-0002-6655-5274, Pyko S. A. ORCID: 0000-0001-6625-3770, Kostareva A. A. ORCID: 0000-0002-9349-6257.

Received: 31.01.2019 **Revision Received:** 13.03.2019 **Accepted:** 20.03.2019

For citation: Streltsova A. A., Gudkova A. Ya., Polyakova A. A., Pyko S. A., Kostareva A. A. Polymorphic variant rs1739843 of heat shock protein beta-7 (*HSPB7*) gene and its relationship with on clinical profile and outcomes in patients with hypertrophic cardiomyopathy (results of a 10-year follow-up). *Russian Journal of Cardiology*. 2019;24(10):7–15
doi:10.15829/1560-4071-2019-10-7-15

В последние годы большое внимание уделяется поиску клинических и молекулярно-генетических предикторов прогрессирования хронической сердечной недостаточности (ХСН), а также роли молекулярных и протеомных механизмов в ее генезе, в том числе при кардиомиопатиях, наиболее распространенной из которых является гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) [1].

Семейство белков теплового шока играет важнейшую роль в поддержании нормального гомеостаза клеточного матрикса, являясь "первой линией защиты клеток" [2, 3]. Они действуют, как молекулярные шапероны, способствуя сворачиванию, деградации и функционированию белков, предотвращая различные формы повреждения кардиомиоцитов [4].

HSPB7 (heat shock protein family B (small) member 7), белок теплового шока 7 — один из представителей белков теплового шока, который экспрессируется в сердечной и скелетной мускулатуре. Rüdebusch J, et al. (2017) показали *HSPB7*, в качестве нового раннего предиктора ремоделирования сердца при ХСН [5]. Будучи одним из наиболее распространенных

миокардиальных транскриптов, *HSPB7* сохраняет контрактильную целостность за счет связывания и стабилизации саркомерных протеинов [6].

Полиморфный вариант rs1739843, расположенный во 2-м интроне гена *HSPB7*, является предметом активного изучения исследователей в течение последнего десятилетия.

Исследования, посвященные анализу ассоциаций между данным полиморфным вариантом гена *HSPB7* и ХСН с сохраненной фракции выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ) у пациентов с ГКМП, в доступной нам литературе отсутствуют. Вместе с тем, актуальность поиска клинических и молекулярно-генетических предикторов нежелательных кардиоваскулярных событий и летальных исходов у больных ГКМП зрелого и пожилого возраста очевидна.

Rowin EJ, et al. (2017) на базе 9,3±8-летнего наблюдения и анализа клинического течения ГКМП у 1000 пациентов из Медицинского Центра Tufts, США, разработали формализованный подход оценки клинического течения и исходов при ГКМП. В основе новой модели оценки прогрессирования заболевания

лежит не только разделение группы на мало-/бессимптомных и симптомных пациентов, но и выделение подгрупп симптомных пациентов, исходя из количества синдромов (1, 2 и более): ХСН III-IV функционального класса (ФК) (NYHA), фибрилляции предсердий (ФП), внезапной сердечной смерти (ВСС), и их сочетаний у одного пациента [7]. Этот подход позволяет выявлять пациентов из группы риска прогрессирования заболевания и нежелательных исходов при ГКМП.

Потенциальное дополнение к данной модели молекулярно-генетических маркеров позволит увеличить степень персонификации при определении прогноза у пациентов с ГКМП.

Целью данной работы явилось изучение связи полиморфного варианта rs1739843 гена белка теплового шока 7 (*HSPB7*) с особенностями клинического течения и исходами при ГКМП и ХСН с применением модели Rowin EJ, et al. (2017) [7].

Материал и методы

Пациенты. Исследование носило характер ретроспективного (7 лет) и проспективного (3 года) когортного исследования.

В период с 2008 по 2018гг проанализировано 276 историй болезни, обследован 161 пациент с ГКМП.

Для генетического исследования была сформирована группа больных ГКМП в возрасте ≥ 45 лет ($n=108$), мужчин — 49%, женщин — 51%. Пациенты были обследованы по факту госпитализации с нарастанием проявлений ХСН и решения вопроса о хирургической и нехирургической редукции межжелудочковой перегородки (МЖП), коррекции желудочковых нарушений сердечного ритма, в том числе постановки имплантируемого кардиовертера-дефибриллятора (ИКД), купирования ФП, в том числе с помощью интервенционных методов, а также трансплантации сердца, и направлены на генетическое исследование.

Критериями включения явились: гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ) ≥ 15 мм в одном или более сегментов ЛЖ по данным эхокардиографического исследования (ЭхоКГ), соответствующей критериям ГКМП согласно клиническим рекомендациям Европейского общества кардиологов по диагностике и лечению ГКМП от 2014г [1]; наличие ХСН и исходно сохраненной ФВ ЛЖ ($\geq 50\%$) на момент начала исследования; возраст ≥ 45 лет. При этом, учитывался факт, что ГКМП обычно характеризуется небольшой полостью ЛЖ и нормальной систолической функцией ЛЖ, значения ФВ ЛЖ $< 50\%$ для пациентов с ГКМП должны рассматриваться как критические, отражающие тяжелое нарушение систолической функции ЛЖ [1].

Группу контроля для генетического исследования составили 192 человека без сердечно-сосудистых

заболеваний и другой сопутствующей тяжелой патологией.

Протокол исследования был одобрен Этическим комитетом. До включения в исследование у всех участников было получено письменное информированное согласие, в том числе генетического анализа.

Методы. Пациенты были обследованы с применением стандартных клинико-лабораторных и инструментальных методов диагностики: электрокардиография (ЭКГ), суточное мониторирование ЭКГ, ЭхоКГ.

Дизайн исследования включал в себя оценку особенностей клинического течения, определения вариантов клинического течения и исходов ГКМП с применением нового методического подхода, предложенного Rowin EJ, et al. (2017) [7].

Разработанная Rowin EJ, et al. (2017) модель предполагает 8 вариантов возможного развития заболевания, с учетом появления синдромов и их возможных сочетаний (рис. 1):

- 1) 1 клинический вариант: малосимптомное течение с отсутствием синдромов на фоне медикаментозной терапии
- 2) 2 клинический вариант: ХСН III-IV ФК (NYHA)
- 3) 3 клинический вариант: ФП
- 4) 4 клинический вариант: ВСС
- 5) 5 клинический вариант: ХСН III-IV ФК (NYHA)+ФП
- 6) 6 клинический вариант: ХСН III-IV ФК (NYHA)+ВСС
- 7) 7 клинический вариант: ФП+ВСС
- 8) 8 клинический вариант: ХСН III-IV ФК (NYHA)+ФП+ВСС

Для анализа полученных данных, разделение пациентов в возрасте ≥ 45 лет на клинические варианты развития ГКМП осуществлялось по признаку наличия синдромов и их количества. Конечной точкой исследования считали летальный исход в сроки с 2008 по 2018гг.

Синдромы ГКМП:

- 1) ВСС, постановка ИКД по причине документированной фибрилляции желудочков (ФЖ) или желудочковой тахикардии (ЖТ) или успешно проведенные реанимационные мероприятия по поводу остановки сердца во внебольничных условиях — ВСС;
- 2) Прогрессирование симптомов ХСН до III-IV ФК (NYHA), рефрактерной к максимально подобранной медикаментозной терапии, связанное/не связанное с наличием обструкции выходного тракта ЛЖ (ВТЛЖ), с сохраненной/сниженной ФВ ЛЖ — ХСН III-IV ФК (NYHA);
- 3) Постоянная или персистирующая ФП или повторяющиеся симптомные или клинически определяемые пароксизмальные эпизоды ($n>2$), требующие медикаментозного вмешательства для восстановления ритма — ФП.

Рис. 1. Клинические варианты прогрессирования ГКМП — адаптировано из Rowin EJ, et al. (2017) [7].

Сокращения: ВСС — внезапная сердечная смерть, ГКМП — гипертрофическая кардиомиопатия, ФК — функциональный класс, ФП — фибрилляция предсердий, ХСН — хроническая сердечная недостаточность.

Отдельно выделены подгруппы пациентов с 2-мя и 3-мя синдромами (рис. 1).

Для изучения полиморфного вариантов rs1739843 гена *HSPB7* ДНК была выделена из периферической крови для последующей аллель-специфичной ПЦР в реальном времени с применением праймеров фирмы Applied Biosystems на амплификаторе Applied Biosystems 7500 Real Time PCR System и набора реагентов фирмы “Синтол”.

Статистическая обработка осуществлялась с помощью пакетов Microsoft Excel 2010, IBM SPSS (пробная версия) и MATLAB R2013a (License Number 40502181). Данные при нормальном распределении представлены в виде: среднее значение $\pm$ стандартное отклонение. При распределении, не являющемся нормальным, указаны медиана и квартили. В начале исследований нормальность распределения проверялась с помощью тестов Колмогорова-Смирнова и Шапиро-Уилка. Дополнительными факторами, влияющими на выводы о нормальности распределения данных, являлись оценки коэффициентов асимметрии и эксцесса, а также визуальный анализ гистограмм и нормальных графиков Q-Q. При выявлении связи качественных переменных были построены таблицы сопряженности, содержащие значения частот, как в абсолютных единицах, так и в процентах. Для сравнения частот использовался критерий соответствия

Пирсона — χ^2 . Если в некоторых ячейках таблицы сопряженности ожидаемая частота была менее 5, то применялся точный метод расчета уровня значимости критерия. Для таблиц сопряженности 2x2 при небольшом числе объектов (до 40-50) использовался критерий χ^2 с поправкой на непрерывность, а при нарушении условий его применения (малая частота в ячейках) — точный критерий Фишера. Различия считались статистически значимыми при значениях $p < 0,05$.

Результаты

Пациенты. На момент начала исследования, большинство пациентов с ГКМП в возрасте ≥ 45 лет имело ХСН II ФК (NYHA) (на фоне проводимой терапии бета-адреноблокаторами в адекватных дозах). Исходно у всех пациентов с ГКМП наблюдалась сохраненная ФВ ЛЖ ($\geq 50\%$), которая варьировала от 50 до 77%, и составила — 64,00 [58,7; 69]%.

Основные ЭхоКГ-параметры и особенности клинического течения, характеризующие пациентов с ГКМП в возрасте ≥ 45 лет, представлены в таблице 1 а, б.

За указанный период наблюдения, у 8 пациентов ФВ ЛЖ снизилась до 40-49%, а у 16 человек стала ниже 40%, в связи с ухудшением течения заболевания на фоне появления синдромов (ХСН III-IV ФК

Таблица 1

Эхокардиографические параметры и особенности клинического течения ГКМП у пациентов в возрасте ≥ 45 лет

1а. Эхокардиографические параметры пациентов с ГКМП в возрасте ≥ 45 лет		1б. Особенности клинического течения ГКМП в возрасте ≥ 45 лет	
Параметр	Me [перцентили]	Параметр	n (%)
Возраст, лет	62 [56; 71,7]	АГ	82 (75,9)
МЖП, мм	18 [16; 21]	ИБС	43 (39,8)
ЗС ЛЖ, мм	13 [11; 16]	ПИКС	25 (23,1)
КДР ЛЖ, мм	48 [43,1; 52]	ХСН, n (%)	
		I ФК (NYHA)	3 (2,9)
		II ФК (NYHA)	54 (51,4)
		III ФК (NYHA)	37 (35,2)
		IV ФК (NYHA)	11 (10,5)
Индекс КДР ЛЖ, мм/м ²	25,5 [22,8; 28,3]	ХСН на момент первичного обследования (ФВ ЛЖ $\geq 50\%$)	108 (100)
ИММ ЛЖ, г/м ²	174,6 [141,3; 215,1]	ХСН к концу периода наблюдения	
		ФВ ЛЖ $\geq 50\%$	84 (77,8)
		ФВ ЛЖ 40-49%	8 (7,4)
		ФВ ЛЖ $< 40\%$	16 (14,8)
ЛП, мм	48 [44; 52,9]	ФП	29 (26,9)
ФВ ЛЖ, %	60 [52; 65]	Ожирение	57 (52,8)
		СД тип 2	26 (24,1)

Сокращения: АГ — артериальная гипертензия, ГКМП — гипертрофическая кардиомиопатия, ЗС ЛЖ — задняя стенка левого желудочка, ИБС — ишемическая болезнь сердца, ИММ ЛЖ — индекс массы миокарда, КДР ЛЖ — конечно-диастолический размер, ЛП — размер левого предсердия, МЖП — межжелудочковая перегородка, ПИКС — постинфарктный кардиосклероз, СД тип 2 — сахарный диабет, тип 2, ФВ ЛЖ — фракция выброса левого желудочка, ФК — функциональный класс, ФП — фибрилляция предсердий, ХСН — хроническая сердечная недостаточность.

(NYHA), ФП, ВСС и их сочетаний), а также за счет вклада коморбидной патологии.

По результатам анализа клинического течения ГКМП, из 108 пациентов в возрасте ≥ 45 лет (мужчин — 49%, женщин — 51%), у 48 человек (44,4%) за время наблюдения был определен первый клинический вариант развития ГКМП: малосимптомное течение, отсутствие синдромов ГКМП на фоне медикаментозной терапии. 4 из них умерли от причин, не связанных с ГКМП (3 пациентов от онкологии, 1 — несчастный случай). У 60 пациентов (55,6%) заболевание прогрессировало с 1 синдромом (n=40), 2 синдромами (n=17), 3 синдромами (n=3), соответственно (табл. 2).

Согласно полученным данным, наиболее частым клиническим вариантом развития ГКМП являлся второй вариант с прогрессированием ХСН до III-IV ФК (NYHA), рефрактерной к максимально подобранной медикаментозной терапии, связанное/не связанное с наличием обструкции ВТЛЖ, данный синдром был выявлен у 28 больных (25,9%) в возрасте ≥ 45 лет. Восьмой клинический вариант развития ГКМП, включающий все 3 синдрома (ХСН III-IV ФК (NYHA)+ФП+ВСС) прогрессирования ГКМП за 10-летний период наблюдения возник у 3 пациентов (2,8%).

Анализ клинических вариантов развития ГКМП и исходов заболевания у пациентов в возрасте ≥ 45 лет представлен в таблице 2.

Анализ частоты летальных исходов и трансплантации сердца в группе ГКМП в возрасте ≥ 45 лет, пока-

Рис. 2. Частота летальных исходов в зависимости от наличия синдромов ГКМП в группе пациентов в возрасте ≥ 45 лет в течение 10-летнего наблюдения.

зал значимые различия в зависимости от количества синдромов.

У пациентов с ГКМП в возрасте ≥ 45 лет при наличии 1-го, 2-х или 3-х синдромов заболевания смертность за 10 лет составила 43,3% (n=26), что значительно превышает аналогичный показатель у пациентов с малосимптомным течением заболевания (8,3% (n=4)) (p<0,001) (рис. 2). При этом у пациентов с 3 синдромами смертность составила 100% (n=3). Трансплантация сердца за указанный период проведена 2-м пациентам с наличием 1-го и 2-х синдромов

Таблица 2

Анализ клинических вариантов развития ГКМП и исходов заболевания у пациентов в возрасте ≥ 45 лет (n=108)

Пути прогрессирования	n (%)	Исходы	n (%)
1 клинический вариант развития ГКМП: малосимптомное течение, отсутствие синдромов ГКМП на фоне медикаментозной терапии Средний возраст: 64,46 $\pm$ 10,23 лет	48 (44,4)	Живы Умерли • Онкология • Другие причины	44 (91,7) 4 (8,3) 3 1
2 клинический вариант развития ГКМП • ХСН III-IV ФК (NYHA) Средний возраст: 63,63 $\pm$ 9,27 лет	28 (26)	Живы Умерли • Развитие дилатационной фазы ГКМП • ОССН на фоне ХСН III-IV ФК (NYHA) с учетом вклада коморбидной патологии • ОНМК • Онкология Трансплантация сердца	12 (42,9) 15 (53,6) 2 10 1 2 1 (3,6)
3 клинический вариант развития ГКМП • Постоянная или персистирующая ФП Средний возраст: 63,08 $\pm$ 8,05 лет	12 (11,1)	Живы Умерли • ОНМК	9 (75) 3 (25)
4 клинический вариант развития ГКМП • ВСС	0		
5 клинический вариант развития ГКМП • ХСН III-IV ФК (NYHA)+ФП Средний возраст: 62,77 $\pm$ 12,25 лет	13 (12)	Живы Умерли • ОССН на фоне ХСН III-IV ФК (NYHA) и ФП	10 (76,9) 3 (23,1)
6 клинический вариант развития ГКМП • ХСН III-IV ФК (NYHA)+ВСС Средний возраст: 55,75 $\pm$ 4,35 лет	4 (3,7)	Живы Умерли • ВСС Трансплантация сердца	1 (25) 2 (50) 2 1 (25)
7 клинический вариант • ФП+ВСС	0		
8 клинический вариант развития ГКМП • ХСН III-IV ФК (NYHA)+ФП+ВСС Средний возраст: 57 $\pm$ 9,54 лет	3 (2,8)	Живы Умерли • ВСС • ОССН на фоне ХСН III-IV ФК (NYHA) и ФП	0 3 (100) 1 2

Сокращения: ВСС — внезапная сердечная смерть, ГКМП — гипертрофическая кардиомиопатия, ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения, ОССН — острая сердечно-сосудистая недостаточность, ФК — функциональный класс, ФП — фибрилляция предсердий, ХСН — хроническая сердечная недостаточность.

Таблица 3

Распределение генотипов и аллелей полиморфного варианта rs1739843 гена *HSPB7* у пациентов с ГКМП и ХСН с сохраненной ФВ ЛЖ ($\geq 50\%$) в возрасте ≥ 45 лет, а также контрольной группе

Генотипы и аллели полиморфного варианта rs1739843 гена <i>HSPB7</i>	Группа ГКМП (n=108), n (%)	Группа контроля (n=192), n (%)
rs1739843		
ТТ	22 (20,4)	8 (4,2)
СТ	52 (48,1)	30 (15,6)
СС	34 (31,5)	154 (80,2)
Т	96 (44,4)	46 (11,98)
С	120 (55,6)	338 (88,02)

Сокращения: ГКМП — гипертрофическая кардиомиопатия, ФВ ЛЖ — фракция выброса левого желудочка, ХСН — хроническая сердечная недостаточность.

заболевания (ХСН III-IV ФК (NYHA), ХСН III-IV ФК (NYHA)+ВСС, соответственно).

Анализ генотипов и аллелей гена полиморфного варианта rs1739843 гена *HSPB7*. Проведен анализ

генотипов и аллелей гена полиморфного варианта rs1739843 гена *HSPB7* у пациентов с ГКМП и ХСН с сохраненной ФВ ЛЖ ($\geq 50\%$) в возрасте ≥ 45 лет и контрольной группе.

Рис. 3. Процентное распределение аллелей полиморфного варианта rs1739843 гена *HSPB7* при 5-м и 8-м клиническом варианте течения ГКМП у пациентов в возрасте ≥ 45 лет.

Генотип ТТ полиморфного варианта rs1739843 гена *HSPB7* в группе ГКМП был выявлен в 20,4% случаев (ТТ:ТС+СС, отношение шансов (ОШ)=5,88, 95% доверительный интервал (ДИ)=2,52-13,75, $p < 0,001$). В группе контроля генотип ТТ полиморфного варианта rs1739843 наблюдался в 4,2% случаев. Распределение аллелей С:Т полиморфного варианта rs1739843 гена *HSPB7* у пациентов с ГКМП составило 55,6:44,4% и значительно отличалось от группы контроля — 88,02:11,98% (ОШ=5,88, 95% ДИ=3,91-8,85, $p < 0,001$).

Генотип СС полиморфного варианта rs1739843 гена *HSPB7* выявлен в 80,2% случаев в контрольной группе, в сравнении с 31,5% — в группе ГКМП (СС:ТС+ТТ, ОШ=0,11, 95% ДИ=0,07-0,19, $p < 0,001$).

Таким образом, были выявлены значимые различия в виде преобладания генотипа ТТ и аллеля Т полиморфного варианта rs1739843 гена *HSPB7* у пациентов с ГКМП и ХСН с сохраненной ФВ ЛЖ ($\geq 50\%$), по сравнению с контрольной группой.

Распределение генотипов и аллелей полиморфного варианта rs1739843 гена *HSPB7* у пациентов с ГКМП и ХСН с сохраненной ФВ ЛЖ ($\geq 50\%$) в возрасте ≥ 45 лет, а также контрольной группе представлено в таблице 3.

У пациентов с ГКМП и 1-м клиническим вариантом течения заболевания (малосимптомное течение, отсутствие синдромов ГКМП на фоне медикаментозной терапии) ($n=48$) генотип ТТ и аллель Т также встречались значимо чаще, по сравнению с контрольной группой. Распространенность генотипа ТТ у пациентов с 1-м клиническим вариантом течения ГКМП составила 16,7% vs 4,2% в контрольной группе (ТТ:ТС+СС, ОШ=4,60, 95% ДИ=1,63-12,99, $p < 0,001$). Генотип СС выявлен в 80,2% в контрольной группе vs 29,2% у больных с 1-м клиническим вариантом течения ГКМП (СС:ТС+ТТ, ОШ=0,10, 95% ДИ=

Рис. 4. Процентное распределение пациентов с ГКМП в возрасте ≥ 45 лет по аллелям rs1739843 гена *HSPB7* при наличии ХСН III-IV ФК (NYHA)+ФП и ХСН III-IV ФК (NYHA)+ФП+ВСС.

0,05-0,21, $p < 0,01$). Распределение аллелей С:Т полиморфного варианта rs1739843 гена *HSPB7* для пациентов с 1-м клиническим вариантом течения ГКМП составило 56,3:43,7% vs 88,02:11,98% в группе контроля (ОШ=5,71, 95% ДИ=3,44-9,49, $p < 0,001$).

Выявлена значимая связь аллелей полиморфного варианта rs1739843 гена *HSPB7* с вариантами клинического течения ГКМП у пациентов с ГКМП в возрасте ≥ 45 лет ($p < 0,01$). На рисунке 3 показано процентное распределение аллелей полиморфного варианта rs1739843 гена *HSPB7* (в %) при 5-м и 8-м клиническом варианте течения ГКМП у пациентов в возрасте ≥ 45 лет.

Установлено, что у пациентов с ГКМП в возрасте ≥ 45 лет аллель Т полиморфного варианта rs1739843 гена *HSPB7* встречался чаще при 5 клиническом варианте: ХСН III-IV ФК (NYHA)+ФП (18,8% vs 6,6%, соответственно), а также 8 клиническом вари-

анте ГКМП: ХСН III-IV ФК (NYHA)+ФП+ВСС (4,2% vs 1,6%, соответственно), по сравнению с аллелем С полиморфного варианта rs1739843 гена *HSPB7*.

Важно отметить, что при анализе процентного соотношения пациентов с ГКМП в возрасте ≥ 45 лет, носителей Т аллеля полиморфного варианта rs1739843 гена *HSPB7*, соответственно, к пациентам, носителям С аллеля при клинических вариантах ХСН III-IV ФК (NYHA)+ФП и ХСН III-IV ФК (NYHA)+ФП+ВСС, обнаружено преобладание аллеля Т более чем в 2 раза (рис. 4).

Таким образом, у пациентов с ГКМП в возрасте ≥ 45 лет аллель Т полиморфного варианта rs1739843 гена *HSPB7* ассоциирован с ХСН III-IV ФК, осложненной наличием ФП, а также ФП и ВСС.

Обсуждение

Возраст — одна из основных детерминант ГКМП. Ранее считалось, что ГКМП в старшей возрастной группе характеризуется доброкачественным течением с умеренными клиническими проявлениями [8-10].

Согласно данным, полученным в исследовании Rowin EJ, et al. (2017), выполненном на когорте из 1000 человек с ГКМП (средний возраст: 52 ± 17 лет), у 46% пациентов за $9,3 \pm 8$ лет наблюдения отсутствовали синдромы ГКМП, а у 54% — заболевание характеризовалось наличием 1, 2 и 3 синдромов [7]. В нашем исследовании, проведенном на сопоставимой по возрасту когорте, в ходе 10-летнего наблюдения малосимптомная ГКМП была верифицирована у 44,4% пациентов.

У большинства пациентов в возрасте ≥ 45 лет, ГКМП характеризовалась симптомным течением (55,6%). Данную группу больных характеризовал 1, 2 и более синдрома заболевания (ХСН III-IV ФК (NYHA), ФП, ВСС или их сочетания), что также согласуется с результатами, полученными в исследовании Rowin EJ, et al. (2017) [7]. Наиболее частым клиническим вариантом развития ГКМП являлся вариант с одним синдромом в виде прогрессирования ХСН до III-IV ФК (NYHA).

Согласно полученным нами результатам особенностью течения ГКМП в данной возрастной группе явилась ХСН различной степени тяжести с сохраненной ФВ ЛЖ ($\geq 50\%$). Схожие данные приводят Но СУ, et al. (2018), подчеркивая, что более чем у 80% пациентов с ГКМП с прогрессированием ХСН до III-IV ФК (NYHA) наблюдалась ФВ ЛЖ $>55\%$ [11]. По результатам крупного многолетнего когортного исследования SHARE регистра (Sarcotomic Human Cardiomyopathy Registry), где была изучена совокупность факторов, влияющих на прогноз и продолжительность жизни, ФП и ХСН являлись ведущими компонентами, определяющими тяжесть ГКМП, возникающая наиболее часто у лиц 50-70 лет. Авторы подчер-

кивают, что частота летальных исходов в группе больных ГКМП 50-69 лет в 3 раза превышает показатели общего населения США [11].

По нашим данным уровень смертности от кардиальных причин у пациентов в возрасте ≥ 45 лет с симптомным течением ГКМП и наличием одного, 2-х и 3-х синдромов за 10-летний период наблюдения составил 43,3%, что значительно превышает аналогичный показатель у пациентов с малосимптомным течением заболевания (без синдромов) ($p < 0,001$). Наиболее прогностически неблагоприятной была группа пациентов с 3 синдромами заболевания: смертность за 10-летний период составила 100%. Но СУ, et al. (2018) показали, что пациенты, с диагностированной ГКМП в старшем возрасте имеют более высокий среднегодовой риск случайной частоты возникновения всех исходов: желудочковых аритмий, ХСН, ФП, смерти [11]. При анализе смертности у пациентов ГКМП в возрасте 45 лет и старше нельзя не учитывать вклад коморбидной патологии (ишемическая болезнь сердца, постинфарктный кардиосклероз, артериальная гипертензия, сахарный диабет 2 типа).

Полиморфный вариант rs1739843 гена *HSPB7* в настоящее время рассматривается как новый генетический маркер клинического течения ХСН. Описана его связь с развитием ХСН со сниженной ФВ ЛЖ ($<40\%$) в зарубежной [12] и отечественной литературе [13]. Механизм реализации эффекта полиморфного варианта rs1739843 на развитие ХСН, возможно, связан как непосредственно с действием гена *HSPB7*, так и с эффектом гена *CLCNKA* (хлорного потенциал-зависимого канала калия), который ассоциирован с повреждениями почечной реабсорбции натрия и соль-чувствительной гипертензии [14, 15].

У больных ГКМП и ХСН с сохраненной ФВ ЛЖ ($\geq 50\%$) в возрасте ≥ 45 лет была выявлена значимо большая частота встречаемости генотипа ТТ и аллеля Т полиморфного варианта rs1739843 гена *HSPB7*, по сравнению с контрольной группой. У пациентов с ГКМП и 1-м клиническим вариантом течения заболевания (малосимптомное течение, отсутствие синдромов ГКМП на фоне медикаментозной терапии) генотип ТТ и аллель Т также встречались значимо чаще, по сравнению с контрольной группой.

Генотип СС и аллель С полиморфного варианта rs1739843 гена *HSPB7* в большей частоте встречался в группе контроля.

При этом обнаружено, что аллель Т значимо чаще встречается у больных ГКМП и наличием 2-х и более синдромов, в составе которых есть ХСН: ХСН III-IV ФК (NYHA)+ФП, ХСН III-IV ФК (NYHA)+ФП+ВСС. Это первое исследование, посвященное связи полиморфного варианта rs1739843 гена *HSPB7* с ХСН III-IV ФК (NYHA) и исходами при симптомной ГКМП в возрасте ≥ 45 лет.

Заключение

Симптомное течение у больных ГКМП в возрастной группе ≥ 45 лет и наличием 2 и более синдромов характеризуется неблагоприятным прогнозом.

У больных ГКМП и ХСН с сохраненной ФВ ЛЖ ($\geq 50\%$) в возрасте ≥ 45 лет была выявлена значимо большая частота встречаемости генотипа ТТ и аллеля Т полиморфного варианта rs1739843 гена *HSPB7*, по сравнению с контрольной группой. При мало-симптомном течении ГКМП, генотип ТТ и аллель Т полиморфного варианта rs1739843 гена *HSPB7* также встречаются значимо чаще, чем в контрольной группе.

Аллель Т полиморфного варианта rs1739843 гена *HSPB7* ассоциирован с наличием у пациентов с ГКМП

в возрасте ≥ 45 лет 2-х и более синдромов, в составе которых есть ХСН: ХСН III-IV ФК (НУНА)+ФП, ХСН III-IV ФК (НУНА)+ФП+ВВС.

Финансирование. Работа выполнена в рамках Государственного задания Министерства здравоохранения Российской Федерации по теме: “Молекулярно-генетические предикторы и морфо-функциональные фенотипы сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса левого желудочка при кардиомиопатиях различного генеза” № госрегистрации АААА-А18-118070690073-2.

Конфликт интересов: все авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.

Литература/References

1. Elliott PM, Anastasakis A, Borger MA, et al. 2014 ESC Guidelines on diagnosis and management of hypertrophic cardiomyopathy: the Task Force for the Diagnosis and Management of Hypertrophic Cardiomyopathy of the European Society of Cardiology (ESC). *European Heart Journal*. 2014;35(39):2733-79. doi:10.1093/eurheartj/ehu284.
2. Brundel BJ, Henning RH, Ke L, et al. Heat shock protein upregulation protects against pacing-induced myolysis in HL-1 atrial myocytes and in human atrial fibrillation. *Journal of Molecular and Cellular Cardiology*. 2006;41(3):555-62. doi:10.1016/j.yjmcc.2006.06.068.
3. Ke L, Qi XY, Dijkhuis AJ, et al. Calpain mediates cardiac troponin degradation and contractile dysfunction in atrial fibrillation. *Journal of Molecular and Cellular Cardiology*. 2008;45(5):685-93. doi:10.1016/j.yjmcc.2008.08.012.
4. Westerheide SD, Morimoto RI. Heat shock response modulators as therapeutic tools for diseases of protein conformation. *Journal of Biological Chemistry*. 2005;280(39):33097-100. doi:10.1074/jbc.R500010200.
5. Rüdebusch J, Benkner A, Poesch A, et al. Dynamic adaptation of myocardial proteome during heart failure development. *PLoS One*. 2017;12(10):e0185915. doi:10.1371/journal.pone.0185915.
6. Golenhofen N, Perng MD, Quinlan RA, et al. Comparison of the small heat shock proteins alphaB-crystallin, MKBP, HSP25, HSP20, and cvHSP in heart and skeletal muscle. *Histochemistry and Cell Biology*. 2004;122(5):415-25. doi:10.1007/s00418-004-0711-z.
7. Rowin EJ, Maron MS, Chan RH, et al. Interaction of Adverse Disease Related Pathways in Hypertrophic Cardiomyopathy. *The American Journal of Cardiology*. 2017;120(12):2256-64. doi:10.1016/j.amjcard.2017.08.048.
8. Maron BJ, Rowin EJ, Casey SA, et al. Hypertrophic Cardiomyopathy in Adulthood Associated With Low Cardiovascular Mortality With Contemporary Management Strategies. *Journal of The American College of Cardiology*. 2015;65(18):1915-28. doi:10.1016/j.jacc.2015.02.061.
9. Maron BJ, Rowin EJ, Casey SA, et al. Risk stratification and outcome of patients with hypertrophic cardiomyopathy ≥ 60 years of age. *Circulation*. 2013;127(5):585-93. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.112.136085.
10. Poliakova AA, Semernin EN, Streltsova AA, et al. Hypertrophic cardiomyopathy in elderly people. *Arterialnaya Gipertenziya*. 2013;19(6):502-5. (In Russ.) Полякова А.А., Семернин Е.Н., Стрельцова А.А., и др. Особенности гипертрофической кардиомиопатии у пожилых пациентов. *Артериальная гипертензия*. 2013;19(6):502-5. doi:10.18705/1607-419X-2013-19-6-502-505.
11. Ho CY, Day SM, Ashley EA, et al. Genotype and Lifetime Burden of Disease in Hypertrophic Cardiomyopathy: Insights from the Sarcomeric Human Cardiomyopathy Registry (SHaRe). *Circulation*. 2018;138(14):1387-98. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.117.033200.
12. Cappola TP, Li M, He J, et al. Common variants in HSPB7 and FRMD4B associated with advanced heart failure. *Circulation: Cardiovascular Genetics*. 2010;3(2):147-54. doi:10.1161/CIRCGENETICS.109.898395.
13. Tishkova VM, Prokopova VV, Kostareva AA, et al. Prevalence of rs10519210, rs1739843, and rs6787362 polymorphisms in patients with CHF of ischemic origin. *Russian Heart Failure Journal*. 2017;18(2):115-21. (In Russ.) Тишкова В.М., Проконова Л.В., Костарева А.А., и др. Распространенность полиморфных вариантов rs10519210, rs1739843, rs6787362 у пациентов с ХСН ишемического генеза. *Журнал Сердечная Недостаточность*. 2017;18(2):115-21. doi:10.18087/rhfj.2017.2.2318.
14. Barlassina C, Dal FC, Lanzani C, Manunta P, et al. Common genetic variants and haplotypes in renal CLCNKA gene are associated to salt-sensitive hypertension. *Human Molecular Genetics*. 2007;16(13):1630-8. doi:10.1093/hmg/ddm112.
15. Sile S, Velez DR, Gillani NB, et al. Haplotype diversity in four genes (CLCNKA, CLCNKB, BSND, NEDD4L) involved in renal salt reabsorption. *Human Heredity*. 2008;65(1):33-46. doi:10.1159/000106060.