

Уважаемые читатели!

Две тысячи восемнадцатый год был ознаменован появлением новых рекомендаций по артериальной гипертензии Европейского общества кардиологов. Первый номер этого года является логичным продолжением последнего номера закончившегося года, в котором был опубликован перевод этих рекомендаций и озвучена позиция российского экспертного сообщества по артериальной гипертензии в отношении наиболее важных их положений.

Сразу несколько работ в номере посвящены изучению роли амортизирующих сосудов в поражении органов-мишеней, повышении артериального давления при ожирении и реализации гипотензивного эффекта новых антигипертензивных препаратов. Это не случайно, поскольку именно ранние изменения эластичности сосудов различного калибра могут быть причиной развития пограничной артериальной гипертензии (высокого нормального артериального давления), при которой в соответствии с новыми рекомендациями уже может начинаться медикаментозная терапия.

Так же несколько исследований, опубликованных в номере, посвящены углубленному изучению роли адипокинового статуса и гуморальных факторов в генезе артериальной гипертензии и повышенной, в том числе сезонной, вариабельности артериального давления.

д.м.н., профессор
Недогода Сергей Владимирович



Несомненный практический интерес представляет оценка экономической эффективности различных технологий при диспансерном наблюдении за больными с артериальной гипертензией, поскольку именно на амбулаторном этапе при достижении целевого артериального давления можно решить важнейшую задачу по снижению сердечно-сосудистой смертности.