Прогностическое значение фибрилляции предсердий у больных, перенесших инфаркт миокарда. Результаты многолетнего наблюдения

Соловьева М. В., Болдуева С. А.

Цель. Оценить влияние предсуществующей фибрилляции предсердий (ФП) на прогноз у больных с инфарктом миокарда (ИМ) 1 типа.**Материал и методы.** Из 1660 больных с ИМ, госпитализированных в кардиологическое отделение СЗГМУ им. И. И. Мечникова в 2013-2018 гг, была выделена основная группа исследования — 100 пациентов с ИМ 1 типа и предсуществующей ФП. Методом "парного подбора" была создана контрольная группа — 200 больных с ИМ 1 типа без ФП, соответствующих по полу, возрасту основной группе. С целью максимально сбалансировать группы по прогностически значимым факторам проведена псевдорандомизация с последующей оценкой влияния ФП на конечные точки.**Результаты.** Пациенты с ИМ 1 типа и предсуществующей ФП исходно имеют более высокую коморбидность, низкую фракцию выброса. У них чаще, чем у пациентов без ФП, были зарегистрированы внутригоспитальная тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) (9,0% vs 1,0%, $p=0,0011$), комбинированная конечная точка (сердечно-сосудистая смертность+ТЭЛА+инсульт) (19,0% vs 10,5%, $p=0,0415$), малые кровотечения (21,0% vs 9,5%, $p=0,0057$). В отдаленном периоде у пациентов с ФП были выше частота госпитализаций в связи с декомпенсацией хронической сердечной недостаточности (ХСН) (отношение шансов (ОШ) = 2,47 (95% доверительный интервал (ДИ) = 1,20-5,08), $p=0,0137$) и встречаемость малых кровотечений (ОШ = 10,77 (95% ДИ = 2,36-49,24), $p=0,0022$). Предсуществующая ФП у пациентов с ИМ 1 типа (после коррекции по всем прогностически значимым факторам) увеличивала риск общей смертности (ОШ = 5,0 (95% ДИ = 1,5-17,1), $p=0,0072$) и сердечно-сосудистой смертности (ОШ = 4,1 (95% ДИ = 1,1-14,9), $p=0,0236$) за весь период наблюдения, повышала риск развития ХСН III-IV функционального класса (ОШ = 4,9 (95% ДИ = 1,2-20,4), $p=0,0147$), не оказывая влияния на частоту ишемических событий.**Заключение.** У пациентов с ИМ 1 типа и предсуществующей ФП внутригоспитальный и отдаленный прогноз хуже, чем у больных без ФП. Предсуществующая ФП у данных пациентов — независимый предиктор тяжелой ХСН при выписке, сердечно-сосудистой смертности и общей смертности за весь период наблюдения.**Ключевые слова:** фибрилляция предсердий, инфаркт миокарда, прогностические факторы.**Отношения и деятельность:** нет.

ФГБОУ ВО Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия.

Соловьева М. В.* — врач-кардиолог клиники кардиологии для лечения больных инфарктом миокарда, аспирант кафедры факультетской терапии, ORCID: 0000-0002-3335-4986, Болдуева С. А. — д.м.н., профессор, зав. кафедрой факультетской терапии, ORCID: 0000-0002-1898-084X.

*Автор, ответственный за переписку (Corresponding author):
morethantea@rambler.ru

ДИ — доверительный интервал, ИМ — инфаркт миокарда, ККТ — комбинированная конечная точка, ОШ — острая сердечная недостаточность, ОШ — отношение шансов, ПИКС — постинфарктный кардиосклероз, СД — сахарный диабет, СКФ — скорость клубочковой фильтрации, ТЭЛА — тромбоэмболия легочной артерии, ФВ — фракция выброса, ФК — функциональный класс, ФП — фибрилляция предсердий, ХСН — хроническая сердечная недостаточность.

Рукопись получена 26.12.2020**Рецензия получена** 09.02.2021**Принята к публикации** 15.02.2021 **Для цитирования:** Соловьева М. В., Болдуева С. А. Прогностическое значение фибрилляции предсердий у больных, перенесших инфаркт миокарда. Результаты многолетнего наблюдения. *Российский кардиологический журнал*. 2021;26(2):4285. doi:10.15829/1560-4071-2021-4285**Prognostic value of atrial fibrillation in patients with myocardial infarction. Long-term follow-up results**

Solovieva M. V., Boldueva S. A.

Aim. To assess the effect of preexisting atrial fibrillation (AF) on the prognosis in patients with type 1 myocardial infarction (MI).**Material and methods.** Of the 1660 patients with MI admitted to the cardiology department of I. I. Mechnikov North-Western State Medical University in 2013-2018, the experimental group was identified — 100 patients with type 1 MI and preexisting AF. A control group consisted of 200 patients with type 1 MI without AF of same sex and age characteristics. In order to balance the groups by significant prognostic factors, propensity score matching was performed with the following assessment of the AF effect on the endpoints.**Results.** Patients with type 1 MI and pre-existing AF initially have higher number of comorbidities and lower ejection fraction. In these patients more often than in patients without AF, the following events were recorded: in-hospital pulmonary embolism (PE) (9,0% vs 1,0%, $p=0,0011$), combined endpoint (cardiovascular mortality+PE+stroke) (19,0% vs 10,5%, $p=0,0415$), minor bleeding (21,0% vs 9,5%, $p=0,0057$). In the long-term period, patients with AF had a higher hospitalization rate due to decompensated heart failure (HF) (odds ratio (OR), 2,47 (95% confidence interval (CI), 1,20-5,08), $p=0,0137$) and the incidence of minor bleeding (OR, 10,77 (95% CI, 2,36-49,24), $p=0,0022$). Preexisting AF in patients with type 1 MI (adjusted for all significant prognostic factors) increased the risk of all-cause (OR, 5,0 (95% CI, 1,5-17,1), $p=0,0072$) and cardiovascular mortality (OR, 4,1 (95% CI, 1,1-14,9), $p=0,0236$) over the entire follow-up period, as well as the risk of class III-IV HF (OR, 4,9 (95% CI, 1,2-20,4), $p=0,0147$), without affecting the prevalence of ischemic events.**Conclusion.** In patients with type 1 MI and preexisting AF, the in-hospital and long-term prognosis is worse than in patients without AF. Preexisting AF in these patients is an independent predictor of severe HF at discharge, cardiovascular mortality, and overall mortality over the entire follow-up period.**Keywords:** atrial fibrillation, myocardial infarction, prognostic factors.**Relationships and Activities:** none.

I. I. Mechnikov North-Western State Medical University, St. Petersburg, Russia.

Solovieva M. V.* ORCID: 0000-0002-3335-4986, Boldueva S. A. ORCID: 0000-0002-1898-084X.

*Corresponding author:
morethantea@rambler.ru

Received: 26.12.2020 Revision Received: 09.02.2021 Accepted: 15.02.2021

For citation: Solovieva M. V., Boldueva S. A. Prognostic value of atrial fibrillation in patients with myocardial infarction. Long-term follow-up results. *Russian Journal of Cardiology*. 2021;26(2):4285. (In Russ.) doi:10.15829/1560-4071-2021-4285

Фибрилляция предсердий (ФП) является общеизвестным фактором риска инсульта и в литературе ее влияние на прогноз чаще рассматривается с этой позиции. Данные о прогнозе у больных с ФП, перенесших инфаркт миокарда (ИМ), противоречивы [1].

Целью исследования явилась оценка влияния предсуществующей ФП на прогноз у больных с ИМ.

Материал и методы

Из 1660 больных, госпитализированных с ИМ в кардиологическое отделение СЗГМУ им. И.И. Мечникова в 2013–2018 гг., были выделены пациенты с ФП — 309 больных (18,6% от общего количества пациентов с ИМ). В связи с тем, что не представлялось возможным однозначно определить у всех поступивших больных сроки появления ФП (впервые возникшая на фоне ИМ или протекавшая бессимптомно до ИМ, т.е. — впервые выявленная), в анализ включались только пациенты с установленной предсуществующей ФП, у которых по данным медицинской документации ФП была зарегистрирована до ИМ. Среди всех поступивших пациентов с ИМ и данной аритмией предсуществующая ФП встречалась у 183 человек (59,2%). Из этих пациентов была сформирована основная группа исследования численностью 100 больных, отвечающих критериям включения. К критериям включения относились ИМ 1 типа, отсутствие тяжелой сопутствующей патологии, которая могла бы повлиять на прогноз, согласие на участие в исследовании. Методом “парного подбора” была создана контрольная группа — 200 больных с ИМ 1 типа без ФП, соответствующих по полу, возрасту пациентам в основной группе.

Далее в тексте речь пойдет только о пациентах с ИМ 1 типа и предсуществующей ФП, как наименее изученной когорте больных с ИМ и ФП. Для упрощения изложения больные основной группы, т.е. с ИМ 1 типа и предсуществующей ФП, также обозначаются как “пациенты с ФП”, больные в контрольной группе — “пациенты без ФП”.

У больных было получено информированное согласие на участие в исследовании. Протокол исследования одобрен локальным этическим комитетом.

Проводилось стандартное обследование пациентов, включавшее коронарографию. После выписки 1 раз в год осуществлялись визиты, при их невозможности — телефонные опросы пациентов.

Время наблюдения в исследовании составило 7,2 года (Me = 2,4 года), без различий в группах ($p=0,526$).

После выписки из стационара была потеряна связь с 4 пациентами в основной группе и 22 — в контрольной.

В основной и контрольной группах исследования изучались как внутригоспитальные, так и внегоспитальные конечные точки: рецидив ИМ, инсульт, тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА), малые и большие кровотечения, сердечно-сосудистая и общая смертность, комбинированная конечная точка (ККТ) (сердечно-сосудистая смертность+ТЭЛА+инсульт), а также наличие острой сердечной недостаточности (ОСН) 3–4 Killip в стационаре, функциональный класс (ФК) хронической сердечной недостаточности (ХСН) к моменту выписки, частота декомпенсаций ХСН в отдаленном периоде.

Статистическая обработка данных выполнена в программе SAS (SAS Institutes Inc., США). Для сравнения внутригоспитального прогноза в группах был использован хи-квадрат, внегоспитального прогноза — модель пропорциональных рисков Кокса с оценкой времени до наступления конечных точек, без учета повторных событий. Время до наступления события оценивалось по методу Каплана-Майера. Для выявления факторов, влияющих на прогноз в группах исследования, использован многофакторный анализ методом логистической регрессии. С целью максимально сбалансировать группы по прогностически значимым факторам проведена псевдорандомизация. Далее для оценки влияния предсуществующей ФП на конечные точки выполнен стратифицированный анализ.

Результаты

Характеристики пациентов в группах исследования.

В таблице 1 приведены основные характеристики пациентов в группах исследования. У больных с ФП был более отягощенный анамнез — чаще встречались сахарный диабет (СД), ишемическая болезнь сердца в анамнезе, постинфарктный кардиосклероз (ПИКС), перенесенные ранее инсульты. Пациенты в основной группе имели более низкую скорость клубочковой фильтрации (СКФ). При этом более выраженные изменения в липидограмме были у пациентов без ФП. Отличий по другим факторам риска ишемической болезни сердца между группами не было.

У пациентов основной группы преобладала постоянная форма ФП — у 49 больных (49,0%). Пароксизмальная форма ФП была у 40 пациентов (40,0%), персистирующая — у 11 (11,0%).

Таблица 1

Характеристики исследуемых пациентов

Признак	Основная группа (n=100)	Контрольная группа (n=200)	Значимость различий
Женщины, абс. (%)	58 (58,0%)	116 (58,0%)	p=1,000
Средний возраст, M±SD, лет	75,5±8,7	75,2±8,5	p=0,775
Индекс массы тела, M±SD, кг/м ²	27,8±5,5	27,4±4,4	p=0,558
Курение, абс. (%)	28 (32,6%)	60 (33,7%)	p=0,890
Сахарный диабет, абс. (%)	45 (45,0%)	63 (31,5%)	p=0,030
Гипертоническая болезнь, абс. (%)	98 (98,0%)	192 (96,0%)	p=0,505
Ишемическая болезнь сердца в анамнезе, абс. (%)	72 (72,0%)	119 (59,5%)	p=0,030
ПИКС, абс. (%)	40 (40,0%)	51 (25,5%)	p=0,012
Инсульт в анамнезе, абс. (%)	21 (21,0%)	23 (11,5%)	p=0,037
Систолическое артериальное давление, M±SD, мм рт.ст.	136,1±11,7	134,0±14,9	p=0,226
СКФ, M±SD, мл/мин/1,73 м ²	56,8±19,4	61,7±17,9	p=0,031
ЛПНП, M±SD, ммоль/л	2,8±0,9	3,3±1,0	p=0,0002
CHA ₂ DS ₂ -VASc, M±SD, баллы	4,6±1,9	-	-
HAS-BLED, M±SD, баллы	1,7±0,9	-	-

Сокращения: ЛПНП — липопротеины низкой плотности, ПИКС — постинфарктный кардиосклероз, СКФ — скорость клубочковой фильтрации.

Таблица 2

Внутригоспитальные события в группах исследования

Внутригоспитальное событие	Основная группа (n=100), абс. (%)	Контрольная группа (n=200), абс. (%)	Значимость различий
Рецидив ИМ	2 (2,0%)	10 (5,0%)	p=0,2113
ТЭЛА	9 (9,0%)	2 (1,0%)	p=0,0011
Инсульт	2 (2,0%)	3 (1,5%)	p=0,1017
Killip 3-4	20 (20,0%)	26 (13,0%)	p=0,127
Малые кровотечения	21 (21,0%)	19 (9,5%)	p=0,0057
Большие кровотечения	1 (1,0%)	3 (1,5%)	p=0,7223
Сердечно-сосудистая смертность	13 (13,0%)	19 (9,5%)	p=0,4276
ККТ (сердечно-сосудистая смертность+ТЭЛА+инсульт)	19 (19,0%)	21 (10,5%)	p=0,0415

Сокращения: ИМ — инфаркт миокарда, ККТ — комбинированная конечная точка, ТЭЛА — тромбоэмболия легочной артерии.

Жалобы больных при поступлении в группы не отличались. 94,0% пациентов в основной и 97,5% в контрольной группе переносили болевой вариант течения ИМ (p=0,189), без значимых различий в характере болей (p=0,436). Пациенты как с ФП, так и без нее реже отмечали одышку (в 15,0% и 9,5% случаев, соответственно, p=0,178), тошноту/рвоту (в 7,0% и 6,0% случаев, p=0,178), синкопальные состояния (5,0% и 2,0% случаев, p=0,281).

Наиболее часто встречались переднебоковой (48,0% в основной группе и 45,0% в контрольной), нижнезадний и нижнебоковой ИМ (по 17,0% в группах), без различий между группами (p=0,7651).

Пациенты с ФП и без ФП не отличались по уровню тропонина (p=0,159), частоте ИМ с подъемом сегмента ST (62,0% и 65,5%, соответственно, p=0,486), желудочковых аритмий (p=0,281), значимых нарушений проводимости (p=0,089), по количеству (p=0,7327) и характеру поражения коронарных артерий (p=0,1956).

Не было достоверных различий между группами исследования и по частоте реваскуляризации инфаркт-связанной артерии в ходе госпитализации (82,0% и 89,5%, соответственно, p=0,0686), и срокам ее выполнения (p=0,494). Вмешательство чаще (у 56,0% пациентов в основной группе и 63,0% в контрольной) выполнялось в течение 6 ч от начала болевого синдрома.

Несмотря на отсутствие различий по вышеперечисленным признакам, для пациентов с ФП была характерна более низкая фракция выброса (ФВ) (55,2±10,5% vs 59,8±10,0% у больных без ФП, p=0,0005). Данная тенденция сохранялась и среди пациентов без перенесенного ИМ в анамнезе (56,2±8,9% vs 61,1±9,3%, p=0,0009). Пациенты с ФП чаще имели значимую митральную регургитацию — в 53,9% случаев против 30,3% у больных без ФП (p=0,0002).

В стационаре все пациенты основной группы получали антитромботическую терапию, включая анти-

Рис. 1. Госпитализации в связи с декомпенсацией ХСН.

Сокращения: ФП — фибрилляция предсердий, ХСН — хроническая сердечная недостаточность.

коагулянты (согласно действующим на тот момент рекомендациям [2, 3]), которую было рекомендовано продолжать после выписки. Учитывая ограниченные размеры статьи, вопросы об особенностях антитромботической терапии и ее влиянии на прогноз будут рассмотрены в других публикациях.

Внутригоспитальный прогноз. Внутригоспитальный прогноз у пациентов с ИМ 1 типа и предшествующей ФП также был хуже, чем у больных без ФП (табл. 2). У них чаще была зарегистрирована ТЭЛА, ККТ (смертность+ТЭЛА+инсульт). При этом у 8 из 9 пациентов с ТЭЛА последняя была зарегистрирована в первые сутки ИМ, у 1 пациента — на вторые сутки госпитализации. 6 пациентов с ТЭЛА не получали антикоагулянтную терапию до госпитализации, у 3 она была неадекватной. Встречаемость других тромбозов и ишемических событий, ОСН (Killip 3-4) в группах не отличалась. Однако были различия по типу внутригоспитальных инсультов. В основной группе оба инсульта являлись кардиоэмболическими и возникли одновременно с ИМ, в контрольной — атеротромботическими ($p=0,0346$). Геморрагические инсульты не зарегистрированы.

Таблица 3

Внегоспитальные события в основной группе в сравнении с контрольной

Внегоспитальное событие	ОШ (95% ДИ)	Значимость различий
Повторные ИМ	0,78 (0,28-2,16)	$p=0,6279$
ТЭЛА	2,45 (0,66-9,12)	$p=0,1818$
Инсульт	1,45 (0,55-3,80)	$p=0,4546$
Декомпенсация ХСН	2,47 (1,20-5,08)	$p=0,0137$
Малые кровотечения	10,77 (2,36-49,24)	$p=0,0022$
Большие кровотечения	1,33 (0,22-7,97)	$p=0,7539$
Общая смертность	1,69 (0,95-3,0)	$p=0,0747$
Сердечно-сосудистая смертность	1,71 (0,93-3,15)	$p=0,0825$
ККТ	1,60 (0,92-2,80)	$p=0,0954$

Сокращения: ДИ — доверительный интервал, ИМ — инфаркт миокарда, ККТ — комбинированная конечная точка, ОШ — отношение шансов, ТЭЛА — тромбоэмболия легочной артерии, ХСН — хроническая сердечная недостаточность.

Среди больных с ИМ 1 типа и предшествующей ФП значительно чаще, чем у пациентов без ФП, встречались малые кровотечения. Различий по источнику малого кровотечения между группами не было

Рис. 2. Выживаемость в группах исследования.
Сокращение: ФП — фибрилляция предсердий.

($p=0,7015$). Большие кровотечения были редкими в обеих группах.

Все случаи смерти в стационаре имели сердечно-сосудистый генез, без различий в её механизмах в группах ($p=0,6003$). Наиболее распространенными были асистолия (в 53,8% случаев в основной группе и 63,1% в контрольной), разрыв миокарда (23,1% и 21,0%), реже зарегистрированы фибрилляция желудочков (15,4% и 5,3%), ТЭЛА (по 1,0%), инсульт (1,0% в контрольной группе).

К моменту выписки у большинства пациентов в обеих группах наблюдалась ХСН. Более тяжелая ХСН была в основной группе: III ФК имел место у 21,8% пациентов с ФП vs 5,49% без ФП ($p=0,0001$), II ФК — у 80,2% vs 68,9% ($p=0,046$).

Следует отметить, что все пациенты с ИМ, имевшие ФП (как предшествующую, так и впервые установленную ФП), умирали в ходе госпитализации чаще, чем без ФП (18,5% vs 6,8%, $p<0,0001$).

Отдаленный прогноз. Повторные ИМ были зарегистрированы у 6,0% больных в основной группе и 8,8% в контрольной ($p=0,3140$). Все повторные

ИМ у пациентов с ФП и большинство ИМ (10 из 14) в контрольной группе были I типа.

У больных с ФП эпизоды декомпенсации ХСН возникали чаще, чем у пациентов без ФП (у 19,3% vs 8,8%) ($p=0,0239$). Связанные с этим госпитализации также наблюдались в 2,5 раза чаще (табл. 3) и наступали быстрее (рис. 1).

Пациенты в основной группе в целом чаще нуждались в повторных экстренных госпитализациях — в 42,1% случаев vs 26,4% в контрольной группе ($p=0,0179$). Причины экстренных госпитализаций, не связанных с конечными точками, отличались: у пациентов с ФП в 5 из 9 случаев они были обусловлены пароксизмами ФП, в контрольной группе в 7 из 10 — гипертоническим кризом ($p=0,0397$).

Инсульт был зарегистрирован у 8,4% пациентов с ФП и 6,3% без ФП ($p=0,5990$). Типы инсультов у пациентов в группах значительно отличались ($p=0,0001$): все инсульты в основной группе имели кардиоэмболический генез, в контрольной — 8 из 10 были атеротромботическими, 2 из 10 — геморрагическими.

Таблица 4

Количественные признаки в двух выбранных квинтилях

Признак	Основная группа (ФП) (n=28)	Контрольная группа (без ФП) (n=62)	Значимость различий
	Среднее (95% ДИ)		
ФВ, %	60,5 (57,8-63,2)	61,7 (60,1-63,7)	p=0,4032
СКФ, мл/мин/1,73 м ²	65,1 (58,8-71,4)	62,6 (58,4-66,8)	p=0,5236
Тропонин при поступлении, пг/мл	1002,7 (412,1-1593,3)	696,0 (301,9-1090,1)	p=0,3968
Возраст, лет	75,3 (72,0-78,7)	75,6 (73,4-77,9)	p=0,8677

Сокращения: ДИ — доверительный интервал, СКФ — скорость клубочковой фильтрации, ФВ — фракция выброса, ФП — фибрилляция предсердий.

Число внегоспитальных больших кровотечений было небольшим в обеих группах — 2 у пациентов с ФП и 3 у больных без ФП. Малые кровотечения встречались в 11 раз чаще в основной группе (табл. 3). Они были зарегистрированы у 12,0% больных с ФП, 1,3% — без ФП (p=0,0005). Большинство больших кровотечений были из желудочно-кишечного тракта: все в основной группе и 2 из 3 в контрольной (p=0,6880). Малые кровотечения в контрольной группе были носовыми, в основной — в 7 из 10 случаев — макрогематурией (p=0,0001).

Общая смертность в основной группе составила 27,7%, в контрольной — 16,3%, без значимых различий (p=0,1228). Причины смерти также не отличались (p=0,4207). В основной группе смертность имела сердечно-сосудистый генез в 82,6% случаев, в контрольной группе — в 88,3%. Наиболее распространенными причинами смерти в группах были ТЭЛА (21,7% и 11,5%, соответственно), инсульт (13,0% и 19,3%), внезапная сердечная смерть (13,0% и 11,5%), ИМ (8,7% и 11,5%).

Следует отметить, что прогноз не зависел от формы ФП (p>0,05). Выживаемость была значительно хуже у пациентов в основной группе (рис. 2).

ФП как независимый прогностический фактор у больных, перенесших ИМ. Поскольку основная и контрольная группы отличались по факторам, влияющим на прогноз, был проведен многофакторный анализ методом логистической регрессии. По результатам данного анализа сердечно-сосудистая смертность за весь период наблюдения в обеих группах исследования была выше у больных с более низкой ФВ (p=0,0005), ОШ Killip 3-4 (p=0,0176), СД (p=0,0388) и перенесенным ранее инсультом (p=0,0204). Остальные факторы, включая предсуществующую ФП, не оказывали значимого влияния на данную конечную точку. Однако предсуществующая ФП имела тесную взаимосвязь с ФВ и ОШ Killip 3-4, поэтому для оценки прогностического значения именно ФП был выполнен анализ методом подбора пар по индексу соответствия (псевдорандомизация).

Все пациенты были разделены на 5 равных по численности групп (квинтилей) по индексу соответствия, являющемуся совокупным показателем схо-

Таблица 5

ОШ конечных точек в основной и контрольной группах в двух выбранных квинтилях

Конечная точка	ОШ (95% ДИ)	Значимость различий
ХСН III-IV ФК при выписке	4,9 (1,2-20,4)	p=0,0147
Декомпенсация ХСН	2,7 (0,6-11,9)	p=0,1746
ИМ	1,3 (0,2-8,2)	p=0,8059
Инсульт	1,8 (0,3-11,9)	p=0,5509
ТЭЛА	1,3 (0,1-13,5)	p=0,8193
Общая смертность	5,0 (1,5-17,1)	p=0,0072
Сердечно-сосудистая смертность	4,1 (1,1-14,9)	p=0,0231
ККТ	2,8 (0,9-8,8)	p=0,0796

Сокращения: ДИ — доверительный интервал, ИМ — инфаркт миокарда, ККТ — комбинированная конечная точка, ОШ — отношение шансов, ТЭЛА — тромбоэмболия легочной артерии, ФК — функциональный класс, ХСН — хроническая сердечная недостаточность.

жести больных по возрасту, ОШ (Killip 3-4), ПИКС, СД, уровню ФВ, СКФ, тропонина. При разделении на квинтили принадлежность к группе не учитывалась. Далее были выбраны 2 квинтиля самые близкие по численности больных в группах исследования, средним значениям ФВ (как наиболее значимого прогностического фактора) и наименьшему разбросу ФВ в квинтиле. В данных квинтилях количественные признаки (табл. 4) и качественные признаки (ОШ (p=0,4998), ПИКС (p=0,4615), СД (p=0,8688)) в группах не отличались.

Полученные в ходе стратифицированного анализа результаты влияния предсуществующей ФП на прогноз отражены в таблице 5. У пациентов с перенесенным ИМ 1 типа предсуществующая ФП увеличивала риск общей и сердечно-сосудистой смертности за весь период наблюдения, повышала риск развития более тяжелой ХСН при выписке.

Обсуждение

Несмотря на то, что предсуществующая ФП среди пациентов с ИМ преобладает, большинство проведенных исследований по изучению прогноза у пациентов с ИМ и ФП посвящено впервые возникшей ФП. Сведения, касающиеся больных с ИМ и предсуществующей ФП, наиболее противоречивы. После

коррекции по исходным характеристикам в одних исследованиях предсуществующая ФП ухудшала только внутригоспитальную смертность [4], в других — лишь отдаленный прогноз [5, 6], в отдельных — на прогноз независимо не влияла [7]. В приведенные исследования включались как пациенты со всеми формами острого коронарного синдрома [4], так и больные только с ИМ с подъемом ST [7]; не во всех работах была выполнена коррекция по ФВ [6].

В настоящем исследовании предсуществующая форма ФП встречалась у большей части больных с ИМ. Эти пациенты имели более отягощенный анамнез, более низкую ФВ и выраженную митральную недостаточность, что соответствует данным литературы [1]. Вместе с тем существенных различий между группами по клинической картине при поступлении не было.

Как и в опубликованных исследованиях [5, 6], по нашим данным у всех больных с ФП (как с предсуществующей, так и с впервые установленной ФП) и ИМ внутригоспитальная смертность была выше, чем у лиц без ФП.

У больных с предсуществующей ФП, перенесших ИМ 1 типа, по полученным результатам также был хуже как внутригоспитальный, так и отдаленный прогноз. У них встречалось больше тромбоэмболических событий, которые развивались в первые сутки ИМ и объяснялись отсутствием или неадекватностью антикоагулянтной терапии до госпитализации. Подобная тенденция прослеживалась и в отдаленном периоде, однако разница между группами в частоте тромбоэмболических событий не достигла статистической значимости. Пациенты с предсуществующей ФП после перенесенного ИМ 1 типа чаще нуждались в экстренных госпитализациях, в частности, в связи с декомпенсацией ХСН. Они имели

больше малых кровотечений как во время госпитализации, так и в отдаленном периоде, однако большие кровотечения не отличались по частоте от больных без ФП и случались редко. Выживаемость (согласно анализу Каплана-Майера) у пациентов с предсуществующей ФП была достоверно хуже, чем у больных без ФП.

В ходе исследования было показано, что на смертность как у больных с предсуществующей ФП, так и без ФП влияет сниженная ФВ, выраженная ОСН, наличие СД и перенесенного ранее инсульта. После коррекции по всем прогностически значимым факторам было доказано, что предсуществующая ФП у пациентов с ИМ 1 типа независимо повышает сердечно-сосудистую и общую смертность за весь период наблюдения и определяет более тяжелую ХСН при выписке.

Заключение

У пациентов с предсуществующей ФП при ИМ хуже как внутригоспитальный, так и отдаленный прогноз по сравнению с больными с ИМ без ФП. Предсуществующая ФП у пациентов с ИМ 1 типа является независимым предиктором общей и сердечно-сосудистой смертности за весь период наблюдения, а также — нарастания ХСН в ранние сроки после ИМ. Поэтому у этих больных важно использовать все медикаментозные и немедикаментозные возможности по предупреждению прогрессирования ХСН. Кроме того, на наш взгляд, необходимо рассмотреть вопрос о включении предсуществующей ФП в прогностические шкалы при ИМ.

Отношения и деятельность: все авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.

Литература/References

1. Boldueva SA, Soloveva MV, Oblavatskii DV, et al. Myocardial infarction in the group of patients with atrial fibrillation. *Kardiologiya*. 2020;60(1):53-61. (In Russ.) Болдueva С. А., Соловьева М. В., Облaвaтский Д. В. и др. Инфаркт миокарда у больных с фибрилляцией предсердий. *Кардиология*. 2020;60(1):53-61. doi:10.18087/cardio.2020.1.n620.
2. Roffi M, Patrono C, Collet J-P, et al. 2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation. *European Heart Journal*. 2016;37:267-315. doi:10.1093/eurheartj/ehv320.
3. Ibanez B, James S, Agewall S, et al. 2017 ESC guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation. *European Heart Journal*. 2018;39(38):119-77. doi:10.1093/eurheartj/ehx393.
4. Biasco L, Radovanovic D, Moccetti M, et al. Newonset or preexisting atrial fibrillation in acute coronary syndromes: two distinct phenomena with a similar prognosis. *Revista Española de Cardiología (English Edition)*. 2019;72(5):383-91. doi:10.1016/j.rec.2018.03.002.
5. Batra G, Svennblad B, Held C, et al. All types of atrial fibrillation in the setting of myocardial infarction are associated with impaired outcome. *Heart*. 2016;102(12):926-33. doi:10.1136/heartjnl-2015-08678.
6. Jabre P, Jouven X, Adnet F, et al. Atrial fibrillation and death after myocardial infarction. A community study. *Circulation*. 2011;123:2094-100. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.110.990192.
7. Consuegra-Sánchez L, Melgarejo-Moreno A, Galcerá-Tomás J, et al. Short and longterm prognosis of previous and newonset atrial fibrillation in STsegment elevation acute myocardial infarction. *Revista Española de Cardiología (English Edition)*. 2015;68(1):31-8. doi:10.1016/j.rec.2014.03.017.