



ПРЕСС-РЕЛИЗ
26.04.2023

Компания "ЭГИС" вывела на рынок первую и единственную в России комбинацию аторвастатина и эзетимиба в одной капсуле¹

Фармацевтическая компания "ЭГИС" вывела на российский рынок препарат для лечения гиперхолестеринемии с фиксированными дозами аторвастатина и эзетимиба в одной капсуле¹. Новая комбинация, не имеющая аналогов в России, зарегистрирована под торговым наименованием Торвазин® Плюс. Новая фиксированная комбинация позволит повысить приверженность у пациентов, которые принимают аторвастатин и эзетимиб раздельно. Достижению целевых показателей терапии также способствует наличие трех фиксированных дозировок (капсулы, 10 мг + 10 мг; 20 мг + 10 мг; 40 мг + 10 мг)², а однократный прием в сутки значительно упрощает режим медикаментозной терапии.

Болезни системы кровообращения — ведущая причина смертности в мире. Только в России ее процент достигает 56% в структуре общей смертности, оставляющая далеко позади такие причины, как новообразования (16%), болезни органов дыхания (8%) или пищеварения (7%)³. И именно высокая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) вносит основной вклад в низкую продолжительность жизни в Российской Федерации (РФ). Бремя атеросклероза и дислипидемии в РФ чрезвычайно велико. К сожалению, Россия находится в числе лидеров по ССЗ в целом, и по ишемической болезни сердца (ИБС), и по инсультам, в частности.

Убедительные данные разных клинических исследований показывают, что снижение общего холестерина — наиболее мощный фактор влияния на показатели смертности от ИБС⁴. В частности, было установлено, что снижение холестерина липопротеидов низкой плотности (ХС-ЛНП) на каждый 1 ммоль/л приводит к снижению риска инфаркта миокарда (-23%), сердечно-сосудистой смерти (-19%) и общей смерти (-12%)⁵.

Согласно Клиническим рекомендациям Минздрава России "Нарушения липидного обмена" от 2023г, препаратами выбора для достижения целевых показателей ХС-ЛНП являются статины⁶. Однако если монотерапия статином не позволяет достичь

цели, следует рассмотреть возможность комбинированной терапии статина с эзетимибом, предпочтительно в одной таблетке или капсуле (у лиц очень высокого риска с уровнем ХС-ЛНП >4 ммоль/л рекомендовано начать гиполипидемическую терапию сразу с комбинации статина с эзетимибом, предпочтительно в одной таблетке или капсуле)⁶.

Комбинация аторвастатина и эзетимиба (Торвазин® Плюс) имеет двойной механизм действия: аторвастатин ингибирует синтез холестерина в печени и тем самым снижает повышенную концентрацию ХС-ЛНП, общего холестерина и триглицеридов². Эзетимиб, в свою очередь, ингибирует всасывание холестерина в кишечнике². Результаты клинических исследований продемонстрировали, что комбинация этих действующих веществ снижает ХС-ЛНП более чем в два раза эффективнее, чем удвоение дозы аторвастатина⁷.

"Мы убеждены, что современные лекарственные средства, особенно в такой сложной сфере, как кардиология, должны работать подобно тончайшему хирургическому инструменту — действовать максимально точно и при этом безопасно для пациента. Первичная гиперхолестеринемия — именно тот тип патологии, когда эффективность терапии в наибольшей степени зависит от правильного подбора препарата, дозировки и приверженности лечению на длительной дистанции. В портфеле "ЭГИС" есть две комбинации статин+эзетимиб в фиксированных дозах: розувастатин+эзетимиб (Розулип® Плюс) и недавно зарегистрированная комбинация аторвастатина и эзетимиба (Торвазин® Плюс). Надеемся, что благодаря нашим разработкам, врачи смогут более индивидуально подходить к назначению дозировок, а у пациентов, в свою очередь, появится больше возможностей для достижения целевых значений ХС-ЛНП и повышения качества жизни", — комментирует Кшиштоф Скуп, генеральный директор ООО "ЭГИС-РУС".

О компании "ЭГИС-РУС"

ООО "ЭГИС-РУС" — дочернее предприятие венгерской компании ЗАО "Фармацевтический завод

ЭГИС" на территории России. Компания "ЭГИС", штаб-квартира располагается в Будапеште, Венгрия, является одним из ведущих производителей дженерических лекарственных средств в регионах Центральной и Восточной Европы и странах СНГ. Деятельность компании охватывает все звенья производственно-сбытовой фармацевтической цепочки: от исследований и разработок, производства активных фармацевтических ингредиентов и готовой продукции до продаж и маркетинга.

Наибольшую долю в общем обороте компании составляют лекарственные препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой и центральной нервной

систем, в т.ч. аллергических и гинекологических заболеваний.

"ЭГИС" поставляет свою продукцию в различных лекарственных формах в 62 странах мира. Компания "ЭГИС", принадлежащая Servier Group, имеет свои иностранные представительства и филиалы в 17 странах мира.

Последовательные инвестиции в развитие производства являются важными шагами к достижению стратегических целей "ЭГИС", направленных на высокотехнологичное развитие производства фармацевтической продукции.

1. Государственный реестр лекарственных средств [Электронный ресурс] (Дата доступа 14.04.2023) URL: <https://grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx>.
2. Общая характеристика лекарственного препарата Торвазин® Плюс. Регистрационное удостоверение ЛП-№(000855)-(РГ-RU).
3. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] (Дата доступа 14.04.2023) URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/12781> (Дата доступа 19.04.2023).
4. Ford ES, Ajani UA, Croft JB, et al. Explaining the decrease in US deaths from coronary disease, 1980-2000. *New England Journal of Medicine*. 2007;356(23):2388-98. doi:10.1056/NEJMsa053935.
5. Baigent C, Keech A, Kearney PM, et al. Efficacy and safety of cholesterol-lowering treatment: prospective meta-analysis of data from 90,056 participants in 14 randomized trials of statins. *Lancet*. 2005;366(9493):1267-78. doi:10.1016/S0140-6736(05)67394-1.
6. Клинические рекомендации 752. Нарушения липидного обмена. Одобрены научно-практическим советом Минздрава РФ. [Электронный ресурс] (Дата доступа 14.04.2023) cr.minzdrav.gov.ru/recommend/752_1.
7. Leiter LA, Bays H, Conard S, et al. Efficacy and safety of ezetimibe added on to atorvastatin (40 mg) compared with uptitration of atorvastatin (to 80 mg) in hypercholesterolemic patients at high risk of coronary heart disease. *Am J Cardiol*. 2008;102(11):1495-501. doi:10.1016/j.amjcard.2008.09.076.

Материал предназначен для специалистов здравоохранения

ООО ЭГИС-РУС

121552, г. Москва, ул. Ярцевская, д. 19, блок В, этаж 13

Тел.: +7 (495) 363-39-66